

コード番号	薬剤名	採血時期
抗てんかん剤		
34300	フェノバルビタール	投与直前(トラフ)
34305	フェニトイン	経口：投与直前(トラフ) 静注：投与直前(トラフ)、投与後2～4時間
34310	カルバマゼピン	投与直前(トラフ)
34315	プリミドン	
34320	バルプロ酸	
34325	エトスクシמיד	投与直前(トラフ)* *半減期が長い場合ため随時でも可ですが、定刻を守って下さい。
34330	トリメタジオン	
34335	クロナゼパム	
34340	ニトラゼパム	
34354	ラコサמיד	次回投与直前(トラフ)
34356	ガバペンチン	指定なし
34361	トピラマート	次回投与直前(トラフ)
34365	ジアゼパム	投与直前(トラフ)ただし、抗てんかん剤として用いる場合
34355	ソニサמיד	投与直前(トラフ)
34360	スルチアム	随時
34555	アセタゾラミド	指定なし
34368	クロバザム	
向精神薬		
34405	リチウム	投与直前(トラフ)
34415	ハロペリドール	
34420	クロルプロマジン	次回投与直前(トラフ)
34425	プロムペリドール	随時(ただし、採血時刻を一定とする)
強心剤		
34500	ジゴキシン	投与直前(トラフ)
気管支拡張剤		
34510	テオフィリン	経口：投与直前(トラフ)が多いが、副作用がテオフィリン由来か判断するため、ピーク値近辺を採血することもある。 静注：投与開始後4～6時間およびその後、12～24時間毎
抗生物質・科学療法剤		
34370	ゲンタマイシン	静注：投与後0.5～1時間
34375	トブラマイシン	点滴静注：投与直後(ピーク)および次回投与直前(トラフ)
34380	アミカシン	
34385	バンコマイシン	投与前30分以内(トラフ)
34390	アルベカシン	投与開始1時間後(30分で投与した場合は終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)
34560	テイコプラニン	投与前30分以内(トラフ)

コード番号	薬剤名	採血時期
免疫抑制剤		
34520	シクロスポリン	経口：投与直前(トラフ) 静注：投与直前(トラフ)必要に応じて投与直後(ピーク)
34525	タクロリムス	経口：投与直前(トラフ) 静注：投与直前(トラフ)必要に応じて投与直後(ピーク)
解熱・鎮痛消炎剤		
34495	アセトアミノフェン	投与直前(トラフ) 大量に服薬した患者においては、中毒発現が疑われる場合に随時
抗悪性腫瘍剤		
34575	メトトレキサート	ロイコボリン救援療法時 24、48、72時間後
抗不整脈剤		
34430	プロカインアミド	投与直前(トラフ)
34435	プロプラノロール	
34465	ジソピラミド	
34450	アブリンジン	経口：投与直前(トラフ)および投与後2～4時間(ピーク) 静注：投与直前(トラフ)
34455	メキシレチン	投与直前(トラフ)または投与後約3時間(ピーク)
34475	プロパフェノン	指定なし
34605	フレカイニド	
34470	ピルシカイニド	投与直前(トラフ)
34600	シベンゾリン	朝投与前(トラフ)
34366	アミオダロン	投与直前(トラフ)
34620	ピルメノール	随時